Mitarbeiternummer: 400201
Stand: 30.03.2015

Datenbankstand: 24.03.2015

Gurken

LBG - Pflanzenschutzmittel Liste

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
Fungizid									
2668/0	Acrobat Plus WG	Falscher Mehltau [Pseudoperonospora cubensis]	Dimethomorph 90 g/kg, Mancozeb 600 g/kg	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis	3	3 kg/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) 2 kg/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 4 kg/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	3	31.12.2019	
2668/0	Acrobat Plus WG	Auflaufkrankheiten [-], Pilzliche Blattfleckenerreger [], Falsche Mehltaupilze [Peronospora spp.]	Dimethomorph 90 g/kg, Mancozeb 600 g/kg	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome., Stadium 11 (1-Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet; Erste Laubblätter entfaltet) bis Stadium 12 (2-Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet)	---	2 kg/ha	2	31.12.2019	
1399/0	Basamid Granulat	Freilebende Nematoden [-]	Dazomet 965 g/kg	Vor der Saat bzw. Pflanzung	---	20 g/m² zur Befallsminderung 40 g/m²	1	31.12.2050	
1399/0	Basamid Granulat	Auflaufende Unkrautsamen [-]	Dazomet 965 g/kg	Vor der Saat, Vor der Pflanzung	---	80 g/m³ Erde 20 g/m²	1	31.12.2050	
1399/0	Basamid Granulat	Drahtwurm [Agriotes spp.], Engerlinge [Melolontha melolontha]	Dazomet 965 g/kg	Vor der Saat bzw. Pflanzung	---	40 g/m² bzw, 160 g/m³	1	31.12.2050	
1399/0	Basamid Granulat	Bodenpilze [-]	Dazomet 965 g/kg	Vor der Saat bzw. Pflanzung	---	40 g/m² 160 g/m³ Erde	1	31.12.2050	
2383/0	Bayfidan 050 EW	Echter Mehltau [Sphaerotheca fuliginea]	Triadimenol 50.5 g/l	---	Gurken = 3	0,05 %	---	28.02.2014	28.02.2016

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
2284/0	Bayfidan WG	Echter Mehltau [Sphaerotheca fuliginea]	Triadimenol 50 g/kg	---	4	0,025 %	---	28.02.2014	28.02.2016
3299/0	Collis	Alternaria-Arten [Alternaria spp.], Echter Mehltau [Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum]	Boscalid 200 g/l, Kresoxim-methyl 100 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	3	0,75 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) 0,5 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 0,625 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	3	31.12.2050	
2752/0	Contans WG	Sclerotinia-Arten [Sclerotinia spp.]	Coniothyrium minitans [] 100 g/kg	Bei Befallsgefahr, Vor der Pflanzung, Vor der Saat, Mindestens 2 Monate vor einer möglichen Sclerotinia-Infektion	---	8 kg/ha (bis 20 cm Einarbeitungstiefe) 4 kg/ha (bis 10 cm Einarbeitungstiefe)	1	31.12.2018	
2752/0	Contans WG	Sclerotinia-Arten [Sclerotinia spp.]	Coniothyrium minitans [] 100 g/kg	Nach der Ernte	---	2 kg/ha	1	31.12.2018	
238/0	Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel	Spinnmilben []	Schwefel 800 g/kg	---	7	0,4 %	---	31.12.2050	
2758/0	Flint	Echter Mehltau [Sphaerotheca fuliginea], Stängelbrand [Didymella bryoniae], Echter Mehltau [Erysiphe cichoreacearum]	Trifloxystrobin 500 g/kg	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	3	0,375 kg/ha (Pflanzenhöhe von 50 bis 125 cm) 0,25 kg/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 0,5 kg/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	2	31.12.2050	
1941/0	Netzschwefel Kwizda	Spinnmilben [Tetranychidae]	Schwefel 882 g/kg	Ab Befallsbeginn	7	0,4 %	2	31.12.2050	
2711/0	Ortiva	Echter Mehltau [Sphaerotheca fuliginea], Echter Mehltau [Erysiphe cichoreacearum]	Azoxystrobin 250 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome., Ab Stadium 21 (1. Seitenspross 1. Ordnung sichtbar) bis Stadium 89 (Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht)	3	0,50 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 1,00 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) 0,75 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	2	31.12.2020	

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
3384/0	Polyram WG	Auflaufkrankheiten [-]	Metiram 700 g/kg	Nach der Saat, bis Stadium 12 (2. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet)	---	0,2 g/m²	2	31.12.2015	
3384/0	Polyram WG	Falsche Mehltaupilze [Peronospora spp.]	Metiram 700 g/kg	Bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis, bis Stadium 12 (2. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet)	---	0,2 g/m²	2	31.12.2015	
3109/0	Previcur Energy	Pythium-Arten [Pythium spp.]	Propamocarb 530 g/l, Fosetyl 310 g/l	Vor dem Pflanzen und nach dem Pflanzen, Nach dem Auflaufen bis Stadium 14 (1. Laubblatt am Hauptspross entfaltet) der Kultur	---	3 ml/m²	2	31.12.2017	
3109/0	Previcur Energy	Pythium-Arten [Pythium spp.]	Propamocarb 530 g/l, Fosetyl 310 g/l	Nach der Saat	---	3 ml/m²	2	31.12.2017	
3109/0	Previcur Energy	Pythium-Arten [Pythium spp.]	Propamocarb 530 g/l, Fosetyl 310 g/l	Nach dem Pflanzen	3	3 l/ha	4	31.12.2017	
3159/0	Proplant	Pythium-Arten [Pythium spp.], Phytophthora - Arten [Phytophthora spp.]	Propamocarb 604 g/L	Jungpflanzenanzucht (nach der Saat, vor dem Pflanzen, kurz nach dem Topfen oder Pflanzen)	---	0,15 %	2	31.12.2050	
2906/0	Revus	Falscher Mehltau [Pseudoperonospora cubensis]	Mandipropamid 250 g/l	Bei Befallsgefahr	7	0,45 l/ha 50 bis 125 cm Pflanzenhöhe 0,6 l/ha über 125 cm Pflanzenhöhe 0,3 l/ha bis 50 cm Pflanzenhöhe	4	31.12.2050	
3334/0	Rovral WG	Botrytis [Botrytis cinerea]	Iprodion 750 g/kg	Bei Befallsgefahr	---	0,7 kg/ha	2	31.12.2017	
3334/0	Rovral WG	Sclerotinia-Arten [Sclerotinia spp.]	Iprodion 750 g/kg	Bei Befallsgefahr	---	0,7 kg/ha	2	31.12.2017	
3334/0	Rovral WG	Alternaria-Arten [Alternaria spp.]	Iprodion 750 g/kg	Bei Befallsgefahr	---	0,7 kg/ha	2	31.12.2017	
3334/0	Rovral WG	Rhizoctonia spp. [Rhizoctonia spp.]	Iprodion 750 g/kg	Bei Befallsgefahr	---	0,7 kg/ha	2	31.12.2017	

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
3255/0	Score	Pilzliche Blattfleckenerreger [], Echter Mehltau [Sphaerotheca fuliginea], Echter Mehltau [Erysiphe cichoreacearum]	Difenoconazol 250 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	3	0,8 l/ha (Pflanzengröße über 125 cm) 0,4 l/ha (Pflanzengröße bis 50 cm) 0,6 l/ha (Pflanzengröße 50 bis 125 cm)	3	31.12.2020	
2619/0	Switch	Grauschimmel [Botrytis cinerea]	Cyprodinil 375 g/kg, Fludioxonil 250 g/kg	Bei Infektionsgefahr	3	0,50 kg/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 0,75 kg/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) 1,00 kg/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	3	31.07.2024	
2619/0	Switch	Sclerotinia [Sclerotinia spp.]	Cyprodinil 375 g/kg, Fludioxonil 250 g/kg	Bei Infektionsgefahr	3	0,50 kg/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 0,75 kg/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) 1,00 kg/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	3	31.07.2024	
2645/0	Teldor	Grauschimmel [Botrytis cinerea]	Fenhexamid 500 g/kg	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	3	1,5 kg/ha	3	31.12.2021	
3440/0	TMTD 98% Satec	Auflaufkrankheiten [-]	Thiram 980 g/kg	Vor der Saat	---	4 g/kg Saatgut	1	31.12.2020	
3275/0	Topas	Echter Mehltau [Sphaerotheca fuliginea, Erysiphe cichoracearum]	Penconazol 100 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome.	3	0,250 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 0,500 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) 0,375 l/ha (Pflanzenhöhe von 50 bis 125 cm)	4	31.12.2021	

Insektizid, Akarizid

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
3550/0	Acorit 250 SC	Spinnmilben []	Hexythiazox 250 g/l	Bei Befall, Bis Stadium 89 (Vollreife: Früchte haben art-/sortentypische Fruchtausfärbung erreicht)	3	0,32 l/ha 0,2 l/ha/m Pflanzenhöhe	1	31.08.2024	
2305/0	Acorit flüssig	Spinnmilben []	Hexythiazox 100 g/l	---	4	0,05 %	---	31.05.2015	
2491/0	Amblon	Thripse [Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis]	Raubmilbe [Amblyseius cucumeris]	Vorbeugend oder nach Erstbefall	---	50 - 100 Raubmilben/m²	nach Bedarf	31.12.2017	
2543/0	Ambly-Pack	Thripse [Thysanoptera]	Raubmilbe [Amblyseius cucumeris]	Vorbeugend oder nach Befall	---	Vorbeugend: 50 Raubmilben pro m² Nach Befall: 100 Raubmilben pro m²	Nach Bedarf	31.05.2021	
3510/0	Amblyseius-Breeding-System	Thripse [Thysanoptera]	Raubmilbe [Amblyseius cucumeris]	Vorbeugend oder nach Befall	---	vorbeugend: 0,4 Tüten pro m² nach Befall: 0,4 - 1,25 Tüten pro m²	nach Bedarf	31.03.2029	
3511/0	Amblyseius-System	Thripse [Thysanoptera]	Raubmilbe [Amblyseius cucumeris]	Vorbeugend oder nach Befall	---	nach Befall: 100 Raubmilben pro m² vorbeugend: 50 Raubmilben pro m²	nach Bedarf	31.03.2029	
2544/0	Ambly-Tüte	Thripse [Thysanoptera]	Raubmilbe [Amblyseius cucumeris]	Vorbeugend oder nach Befall	---	Vorbeugend: 0,4 Tüten pro m² Nach Befall: 0,4 - 1,25 Tüten pro m²	Nach Bedarf	31.05.2021	
2529/0	Aphidend	Blattläuse [Aphidae]	Gallmücke [Aphidoletes aphidimyza]	Nach Erstbefall, Kurativ	---	1 - 3 Individuen/m²	Nach Bedarf	30.09.2019	
3512/0	Aphidius-System	Blattläuse [Aphidae]	Schlupfwespe [Aphidius colemani]	Vorbeugend oder nach Erstbefall	---	vorbeugend: 1 - 3 A, colemani pro m² nach Befall: 2 - 5 A, colemani pro m²	nach Bedarf	31.03.2029	
3513/0	Aphidoletes-System	Blattläuse [Aphidae]	Gallmücke [Aphidoletes aphidimyza]	Vorbeugend oder nach Erstbefall	---	1 Einheit (=250 Puppen) /50 m²	Nach Bedarf	31.03.2029	
2546/0	Aphi-Pack AA	Blattläuse [Aphidae]	Gallmücke [Aphidoletes aphidimyza]	Vorbeugend oder nach Erstbefall	---	1 Einheit (=250 Puppen) /50 m²	Nach Bedarf	30.09.2019	

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
2545/0	Aphi-Pack Am	Blattläuse, ausgenommen Macrosiphum-Arten [-]	Schlupfwespe [Aphidius colemani]	Vorbeugend oder nach Erstbefall	---	Nach Befall: 2 - 5 A, colemani pro m² Vorbeugend: 1 - 3 A, colemani pro m²	Nach Bedarf	31.05.2021	
2530/0	Aphipar	Blattläuse, ausgenommen Macrosiphum-Arten [-]	Schlupfwespe [Aphidius colemani]	Nach Erstbefall, Kurativ	---	0,5 - 1 Individuum/m²	Nach Bedarf	30.09.2019	
3514/0	Biobest Encarsia	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Erzwespe [Encarsia formosa]	Vorbeugend oder nach Befall	---	bei Befall: mindestens 5 Erzwespen/m² vorbeugend: 1 - 5 Erzwespen/m²	nach Bedarf	31.03.2029	
3515/0	Biobest Phytoseiulus	Spinnmilben [Tetranychidae]	Raubmilbe [Phytoseiulus persimilis]	Bei Erstbefall	---	3 - 20 Raubmilben/m²	Nach Bedarf	31.03.2029	
3068/0	Californicus-System	Spinnmilben []	Raubmilbe [Amblyseius californicus]	Vorbeugend	---	2 - 4 Raubmilben / m²	nach Bedarf	31.05.2021	
2812/0	Calypso	Blattläuse []	Thiacloprid 480 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	3	0,2 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 0,3 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) 0,4 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	2	31.12.2015	
2468/0	Celaflor Blattlausfrei AF	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) []	Kali-Seife 10 g/l	---		---	---	09.10.2013	09.04.2015
2468/0	Celaflor Blattlausfrei AF	Spinnmilben []	Kali-Seife 10 g/l	---		---	---	09.10.2013	09.04.2015
2468/0	Celaflor Blattlausfrei AF	Blattläuse, ausgenommen Mehlige Kohlblattlaus []	Kali-Seife 10 g/l	---		---	---	09.10.2013	09.04.2015

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
2487/0	Chryson	Blattläuse [], Thripse []	Florfliege [Chrysoperla carnea]	Ab Befallsbeginn; bedarfsweise Anwendungswiederholung	---	5 - 10 Larven pro m²	Nach Bedarf	31.03.2018	
2487/0	Chryson	Spinnmilben [Tetranychidae]	Florfliege [Chrysoperla carnea]	Ab Befallsbeginn; bedarfsweise Anwendungswiederholung	---	5 - 10 Larven pro m²	Nach Bedarf	31.03.2018	
3582/0	Chrysopa-System	Mottenschildläuse (Weiße Fliege) [], Thripse []	Florfliege [Chrysoperla carnea]	Nach Befall	---	kurativ: 5 Larven/m²	Nach Bedarf	30.11.2029	
3582/0	Chrysopa-System	Spinnmilben []	Florfliege [Chrysoperla carnea]	Nach Befall	---	kurativ: 5 Larven/m²	Nach Bedarf	30.11.2029	
3582/0	Chrysopa-System	Blattläuse []	Florfliege [Chrysoperla carnea]	Nach Befall	---	stark kurativ: 40 Larven/m² kurativ: 5 Larven/m²	kurativ: nach Bedarf	30.11.2029	
2602/0	Confidor 70 WG	Blattläuse []	Imidacloprid 700 g/kg	Bei Befallsbeginn oder bei Neubefall	3	3,5 g / 1000 Pflanzen	4	31.12.2050	
2602/0	Confidor 70 WG	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) []	Imidacloprid 700 g/kg	Bei Befallsbeginn oder bei Neubefall	3	14 g / 1000 Pflanzen	4	31.12.2050	
2602/0	Confidor 70 WG	Blattläuse []	Imidacloprid 700 g/kg	Bei Befallsbeginn oder bei Neubefall, Nur an Jungpflanzen anwenden	---	0,15 kg/ha	1	31.12.2050	
2210/0	Cymbigon	Saugende Schädlinge []	Cypermethrin 100 g/l	---	14	0,02 %	---	31.12.2050	
2210/0	Cymbigon	Kohlweißling [Pieris spp.]	Cypermethrin 100 g/l	---	14	0,075 l/ha 0,0125 % bzw,	---	31.12.2050	
2210/0	Cymbigon	Kohleule [Mamestra brassicae]	Cypermethrin 100 g/l	---	14	0,075 l/ha 0,0125 % bzw,	---	31.12.2050	
2886/0	Diglyphus-System	Minierfliege [Agromyzidae]	Erzwespe [Diglyphus isaea]	Nach Erstbefall	---	0,1 - 5 Organismen (Diglyphus isaea) pro m²	Bedarfs weise Wiederh olung	30.06.2015	
1769/0	Dipel	Kohlweißling (Raupen) [Pieris sp.]	Bacillus thuringiensis var. kurstaki [] 16000 IU/mg	---	---	0,3 kg/ha	---	30.04.2014	30.04.2016

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
2511/0	Encarsia-System	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Erzwespe [Encarsia formosa]	Vorbeugend oder bei Befall	---	vorbeugend: 1 - 5 Erzwespen/m², bei Befall: mindestens 5 Erzwespen/m²	Nach Bedarf	31.12.2017	
2492/0	Encon	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Erzwespe [Encarsia formosa]	Vorbeugend oder nach Erstbefall	---	bei Befall: mindestens 5 Erzwespen/m² vorbeugend: 1 - 5 Erzwespen/m²	Nach Bedarf	31.12.2017	
3351/0	Envidor	Spinnmilben []	Spirodiclofen 240 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	3	0,48 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) 0,24 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 0,36 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	2	31.12.2023	
3555/0	Eremicus-System	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Schlupfwespe [Eretmocerus eremicus]	Vorbeugend	---	1 Individuum/m²	Nach Bedarf	30.07.2024	
2901/0	Ervipar	Grüne Erbsenblattlaus [Acyrthosiphum pisum], Grünfleckige Kartoffelblattlaus [Macrosiphum euphorbiae], Grünstreifige Kartoffelblattlaus [Aulacorthum solani]	Schlupfwespe [Aphidius ervi]	Ab Befallsbeginn	---	0,5 - 4 Organismen pro m² (kurativ)	Nach Bedarf	31.05.2016	

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
2929/0	Ervi-System	Grüne Erbsenblattlaus [Acyrthosiphum pisum], Grünfleckige Kartoffelblattlaus [Macrosiphum euphorbiae], Grünstreifige Kartoffelblattlaus [Aulacorthum solani]	Schlupfwespe [Aphidius ervi]	Vorbeugend oder bei Befallsbeginn	---	Bei Befall: 0,5 bis 2 Organismen pro m² Vorbeugend: 0,1 bis 0,5 Organismen pro m²	Nach Bedarf	30.06.2017	
2429/0	Etisso Pflanzenschutz AF	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum]	Kali-Seife 10 g/l	---		---	---	09.10.2013	09.04.2015
2429/0	Etisso Pflanzenschutz AF	Spinnmilben [Tetranychidae]	Kali-Seife 10 g/l	---		---	---	09.10.2013	09.04.2015
2429/0	Etisso Pflanzenschutz AF	Blattläuse, ausgenommen Mehlige Kohlblattlaus []	Kali-Seife 10 g/l	---		---	---	09.10.2013	09.04.2015
3282/0	Floramite 240 SC	Gemeine Spinnmilbe [Tetranychus urticae]	Bifenazat 240 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	1	0,48 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) 0,24 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 0,36 l/ha (Pflanzenhöhe von 50 bis 125 cm)	2	30.11.2015	
2483/0	Florfliegen gegen Blattläuse	Blattläuse [Aphidae], Thripse []	Florfliege [Chrysoperla carnea]	Ab Befallsbeginn	---	5 Larven/m²	Nach Bedarf	31.10.2016	
2483/0	Florfliegen gegen Blattläuse	Spinnmilben [Tetranychidae]	Florfliege [Chrysoperla carnea]	Ab Befallsbeginn	---	5 Larven/m²	Nach Bedarf	31.10.2016	
3061/0	Karate Zeon	Beißende Insekten [-]	Lambda-Cyhalothrin 100 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen, Ab Stadium 12 (2. Laubblatt am Hauptspross entfaltet) bis Pflanzenhöhe 50 cm	3	0,075 l/ha	2	31.12.2022	

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
3581/0	Limonica	Thripse [Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis], Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Raubmilbe [Amblydromalus limonicus]	Nach dem Pflanzen der Kultur	---	vorbeugend: 50 Individuen pro m²	Nach Bedarf	30.11.2029	
3581/0	Limonica	Thripse [Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis], Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Raubmilbe [Amblydromalus limonicus]	Nach Befall	---	kurativ: 100 - 250 Individuen pro m²	Nach Bedarf	30.11.2029	
2887/0	Macrolophus-System	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Raubwanze [Macrolophus caliginosus]	Frühjahr (vorbeugend)	---	Mindestens 0,5 Organismen pro m²	Nach Bedarf (mindestens 2)	30.06.2015	
2532/0	Miglyphus	Minierfliege [Agromyzidae]	Erzwespe [Diglyphus isaea]	Nach Erstbefall, Kurativ	---	0,5 Individuum/m²	Nach Bedarf	30.09.2019	
2533/0	Minex	Minierfliege [Agromyzidae]	Brackwespe [Dacnusa sibirica], Erzwespe [Diglyphus isaea]	Nach Erstbefall, Kurativ	---	1 Individuum/m²	Nach Bedarf	30.09.2019	
2547/0	Minierpack	Minierfliege [Agromyzidae]	Brackwespe [Dacnusa sibirica]	Nach Erstbefall	---	1 - 2 D, sibirica pro m²	Nach Bedarf	31.05.2021	
2534/0	Minusa	Minierfliege [Agromyzidae]	Brackwespe [Dacnusa sibirica]	Nach Erstbefall, Kurativ	---	1 Individuum/m²	Nach Bedarf	30.09.2019	
2800/0	Mirical	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) []	Raubwanze [Macrolophus caliginosus]	Vorbeugend, Frühjahr	---	0,25 Organismen/m²	Nach Bedarf	31.12.2050	
2800/0	Mirical	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) []	Raubwanze [Macrolophus caliginosus]	Kurativ, Ab Befallsbeginn	---	1 Organismus/m²	Nach Bedarf	31.12.2050	

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
2963/0	Movento 150 OD	Blattläuse [], Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Spirotetramat 150 g/l	Bei Befallsbeginn bis Stadium 87	3	0,5 l/ha (max, 1 l/ha)	4	31.12.2050	
2739/0	Naturen Bio Schädlingsfrei Obst und Gemüse	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) []	Rapsöl 17 g/l	Nach Befallsbeginn	---	---	3	31.12.2050	
2739/0	Naturen Bio Schädlingsfrei Obst und Gemüse	Blattläuse, ausgenommen Mehlige Kohlblattlaus []	Rapsöl 17 g/l	Nach Befallsbeginn	---	---	3	31.12.2050	
2739/0	Naturen Bio Schädlingsfrei Obst und Gemüse	Spinnmilben []	Rapsöl 17 g/l	Nach Befallsbeginn	---	---	3	31.12.2050	
2699/0	NeemAzal-T/S	Blattläuse []	Azadirachtin 10 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	---	2,5 l/ha	4	14.08.2015	14.08.2015
2699/0	NeemAzal-T/S	Blattläuse []	Azadirachtin 10 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. Sichtbarwerden der ersten Schadorganismen	---	2,5 l/ha	4	15.07.2015	15.07.2015
2823/0	Nemaplus	Trauermücken []	Entomopathogene Nematoden [Steinernema feltiae]	Vorbeugend oder bei Befallsbeginn	---	500,000 Nematoden (L3)/m²	2	31.12.2050	
2520/0	Nematoden gegen Trauermücken	Trauermücken []	Insektenpathogene Nematoden [Steinernema bibionis]	Bei Befall, Larvenstadium der Trauermücken	---	500,000 Nematoden (L3)/m²	Nach Bedarf	31.12.2017	
2396/0	Neudosan	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) []	Kali-Seife 515 g/l	---		2 %	---	09.10.2013	09.04.2015
2396/0	Neudosan	Spinnmilben []	Kali-Seife 515 g/l	---		2 %	---	09.10.2013	09.04.2015
2396/0	Neudosan	Blattläuse, ausgenommen Mehlige Kohlblattlaus []	Kali-Seife 515 g/l	---		2 %	---	09.10.2013	09.04.2015

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
2397/0	Neudosan AF	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) []	Kali-Seife 10 g/l	---		---	---	09.10.2013	09.04.2015
2397/0	Neudosan AF	Blattläuse, ausgenommen Mehlige Kohlblattlaus []	Kali-Seife 10 g/l	---		---	---	09.10.2013	09.04.2015
2397/0	Neudosan AF	Spinnmilben []	Kali-Seife 10 g/l	---		---	---	09.10.2013	09.04.2015
2622/0	Neudosan Neu Blattlausfrei	Saugende Insekten [-]	Kali-Seife 515.1 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	---	18 l/ha	5	31.12.2050	
2622/0	Neudosan Neu Blattlausfrei	Blattläuse [], Weiße Fliegen []	Kali-Seife 515.1 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	---	18 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 36 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) 27 l/ha (Pflanzenhöhe von 50 bis 125 cm)	5	31.12.2050	
2622/0	Neudosan Neu Blattlausfrei	Spinnmilben []	Kali-Seife 515.1 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	---	18 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 36 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) 27 l/ha (Pflanzenhöhe von 50 bis 125 cm)	5	31.12.2050	
2503/0	Orion	Thripse [Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis]	Blumenwanze [Orius majusculus]	Vorbeugend oder ab Erstbefall	---	Kurativ: 1,0 - 5,0 Raubwanzen/m² Gewächshausfläche Vorbeugend: 0,3 - 0,5 Raubwanzen/m² Gewächshausfläche	Nach Bedarf	31.05.2019	

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
2900/0	Orius-System	Thripse [Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis]	Blumenwanze [Orius laevigatus]	Vorbeugend	---	4 - 10 Organismen pro m²	Nach Bedarf, mindest ens 4	31.05.2016	
2488/0	Phyton	Spinnmilben [Tetranychus spp.]	Raubmilbe [Phytoseiulus persimilis]	Ab Erstbefall	---	5 Raubmilben/m²	Nach Bedarf	31.05.2019	
2516/0	Phytoseiulus-System	Spinnmilben []	Raubmilbe [Phytoseiulus persimilis]	Bei Erstbefall	---	3 - 20 Raubmilben/m²	Nach Bedarf	31.12.2017	
3238/0	Pirimor Granulat	Blattläuse []	Pirimicarb 500 g/kg	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	3	Pflanzengröße bis 50 cm: 0,25 kg/ha, Pflanzengröße 50 - 125 cm: 0,375 kg/ha, Pflanzengröße über 125 cm: 0,5 kg/ha	2	31.12.2050	
3075/0	Plenum 50 WG	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) []	Pymetrozine 500 g/kg	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	3	Pflanzengröße 50-125 cm: 5,4 g/100 m² Pflanzengröße über 125 cm: 7,2 g/100 m² Pflanzengröße bis 50 cm: 3,6 g/100 m²	3	31.12.2050	
3075/0	Plenum 50 WG	Blattläuse []	Pymetrozine 500 g/kg	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	3	Pflanzengröße bis 50 cm: 1,2 g/100 m² Pflanzengröße 50-125 cm: 1,8 g/100 m² Pflanzengröße über 125 cm: 2,4 g/100 m²	3	31.12.2050	
2482/0	Räuberische Gallmücken gegen Blattläuse	Blattläuse [Aphidae]	Gallmücke [Aphidoletes aphidimyza]	Ab Befallsbeginn	---	2 Puppen/m²	Nach Bedarf	31.10.2016	
2484/0	Raubmilben gegen Spinnmilben	Spinnmilben [Tetranychidae]	Raubmilbe [Phytoseiulus persimilis]	Ab Befallsbeginn	---	5 Raubmilben/m²	Nach Bedarf	31.10.2016	

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
2490/0	Schlupfwespen gegen Weisse Fliegen	Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Erzwespe [Encarsia formosa]	Nach Erstbefall	---	5 Erzwespen/m²	Nach Bedarf	31.10.2016	
2868/0	Spical	Spinnmilben []	Raubmilbe [Neoseiulus californicus]	Vorbeugend, Frühjahr	---	2-4 Individuen/m²	Nach Bedarf (mind. 2)	31.12.2050	
2868/0	Spical	Spinnmilben []	Raubmilbe [Neoseiulus californicus]	Kurativ, Ab Befallsbeginn	---	6 Individuen/m²	1	31.12.2050	
3296/0	SpinTor	Thripse []	Spinosad 440.4 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	3	0,30 l/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 0,45 l/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm) 0,60 l/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm)	3	31.12.2017	
3141/0	Spruzit Schädlingsfrei	Saugende Insekten [-], Beißende Insekten [-]	Pyrethrine 4.59 g/l, Rapsöl 825.3 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	---	6 l/ha	4	31.12.2050	
2838/0	Spruzit Schädlingsfrei Konzentrat	Saugende Insekten [-], Beißende Insekten [-]	Pyrethrine 36 g/l, Piperonylbutoxid 144 g/l	Bei Befallsbeginn	60 unter Glas	0,6 l/ha	4	31.08.2015	
2935/0	Steinernema carpocapsae Nematoden gegen Maulwurfsgrillen und Wiesenschnaken	Wiesenschnake [Tipula paludosa]	Entomopathogene Nematoden [Steinernema carpocapsae]	nach dem Auftreten von Larvenstadien, Freiland: ab April/Mai, unter Glas: ab März	---	0,5 Mio, Nematoden (L3)/m²	1	31.12.2050	
2935/0	Steinernema carpocapsae Nematoden gegen Maulwurfsgrillen und Wiesenschnaken	Maulwurfsgrillen [Gryllotalpa gryllotalpa]	Entomopathogene Nematoden [Steinernema carpocapsae]	nach dem Auftreten von Larven- und Erwachsenenstadien, Freiland: ab April/Mai, unter Glas: ab März	---	0,5 Mio, Nematoden (L3)/m²	1	31.12.2050	

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
3564/0	Steinernema System	Thripse []	Entomopathogene Nematoden [Steinernema feltiae]	Vorbeugend	7	125,000 Nematoden/m²	Nach Bedarf	30.09.2029	
3564/0	Steinernema System	Thripse []	Entomopathogene Nematoden [Steinernema feltiae]	Nach Befall	---	250,000 Nematoden/m²	3	30.09.2029	
3564/0	Steinernema System	Trauermücken []	Entomopathogene Nematoden [Steinernema feltiae]	Vorbeugend	---	500,000 Nematoden/m²	1	30.09.2029	
3564/0	Steinernema System	Trauermücken []	Entomopathogene Nematoden [Steinernema feltiae]	Nach Befall	7	1 Mio, Nemathoden/m²	Nach Bedarf	30.09.2029	
3564/0	Steinernema System	Miniermotten [-]	Entomopathogene Nematoden [Steinernema feltiae]	Nach Befall	---	250,000 Nemathoden/m²	3	30.09.2029	
3076/0	Swirskii-Breeding System	Thripse [Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis], Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Raubmilbe [Amblyseius swirskii]	Vorbeugend oder nach Befall	---	1 Zuchttütchen/ 2 m²	1	31.05.2021	
3004/0	Swirskii-System	Thripse [Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis], Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Raubmilbe [Amblyseius swirskii]	Nach Befall	---	50 - 100 Individuen/m²	3 - 4	30.04.2019	

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
3004/0	Swirskii-System	Thripse [Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis], Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Raubmilbe [Amblyseius swirskii]	Vorbeugend oder nach Befall	---	1 Zuchttütchen/ 2 m²	1	30.04.2019	
2938/0	Swirski-Mite	Thripse [Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis], Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Raubmilbe [Amblyseius swirskii]	vorbeugend (nach Beginn der Blüte, bei Verfügbarkeit von Pollen)	---	20 Individuen/m²	Nach Bedarf	31.12.2017	
2938/0	Swirski-Mite	Thripse [Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis], Weiße Fliege (Mottenschildlaus) [Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci]	Raubmilbe [Amblyseius swirskii]	Nach Befallsbeginn	---	50 - 100 Individuen/m²	Nach Bedarf	31.12.2017	
3010/0	Thripor-L	Thripse [Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis]	Blumenwanze [Orius laevigatus]	Vorbeugend oder nach Befall	---	kurativ: 1 - 10 Raubwanzen/m² vorbeugend: 0,5 Raubwanzen/m²	nach Bedarf	31.08.2019	
3203/0	Vertimec	Minierfliegen []	Abamectin 18 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	3	0,6 l/ha (Pflanzengröße bis 50 cm) 1,2 l/ha (Pflanzengröße über 125 cm) 0,9 l/ha (Pflanzengröße von 50 bis 125 cm)	5	31.12.2013	31.12.2015

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
3203/0	Vertimec	Spinnmilben []	Abamectin 18 g/l	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	3	0,6 l/ha (Pflanzengröße bis 50 cm) 1,2 l/ha (Pflanzengröße über 125 cm) 0,9 l/ha (Pflanzengröße von 50 bis 125 cm)	5	31.12.2013	31.12.2015
3431/0	XenTari	Freifressende Schmetterlingsraupen [-]	Bacillus thuringiensis var. aizawai [] 540 g/kg	Nach Befallsbeginn, ab Stadium 11 (1. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet; Erste Laubblätter entfaltet), Ab Schlüpfen der ersten Larven, Larvenstadium L1 - L2	---	0,6 kg/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 1,2 kg/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) 0,9 kg/ha (Pflanzenhöhe 50 bis 125 cm)	5	31.12.2017	
3431/0	XenTari	Eulenraupen [Noctuidae]	Bacillus thuringiensis var. aizawai [] 540 g/kg	Nach Befallsbeginn, ab Stadium 11 (1. Laubblatt bzw. Blattpaar oder Blattquirl entfaltet; Erste Laubblätter entfaltet), Ab Schlüpfen der ersten Larven, Larvenstadium L1 - L2	---	2,0 kg/ha (Pflanzenhöhe über 125 cm) 1,0 kg/ha (Pflanzenhöhe bis 50 cm) 1,5 kg/ha (Pflanzenhöhe 50 bis125 cm)	5	31.12.2017	
Molluskizid									
3134/0	Delicia Schnecken-Linsen	Nacktschnecken []	Metaldehyd 30 g/kg	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	---	6 kg/ha	2	31.12.2050	
3134/0	Delicia Schnecken-Linsen	Garten-Schnirkelschnecke [Cepaea hortensis], Östliche Heideschnecke [Xerolentia obvia], Hain-Schnirkelschnecke [Cepaea nemoralis]	Metaldehyd 30 g/kg	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	---	6 kg/ha	2	31.12.2050	
3320/0	Derrex	Nacktschnecken []	Eisen-III-Phosphat 29.7 g/kg	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome., Wiederholung bei erneutem Auftreten von Schnecken und/oder wenn keine Granulate mehr auf der behandelten Fläche vorhanden sind	---	7 kg/ha	4	31.12.2015	

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist
1440/0	Limatox Schneckenkorn	Schnecken []	Metaldehyd 60 g/kg	---	---	3 - 5 kg/ha	---	31.05.2015	
2808/0	Metarex	Nacktschnecken []	Metaldehyd 50 g/kg	Nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf	---	7 kg/ha	2	31.12.2021	
3110/0	Schneckenkorn Biomol	Nacktschnecken []	Eisen-III-Phosphat 16.2 g/kg	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	---	5 g/m²	6	31.12.2020	
3110/0	Schneckenkorn Biomol	Garten-Schnirkelschnecke [Cepaea hortensis], Östliche Heideschnecke [Xerolentia obvia], Hain-Schnirkelschnecke [Cepaea nemoralis]	Eisen-III-Phosphat 16.2 g/kg	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen	---	5 g/m²	6	31.12.2020	
2164/0	Schneckenkorn Limex	Schnecken []	Metaldehyd 59.4 g/kg	Bei Auftreten	---	20 Körner/m² bzw, 6 kg/ha	---	31.05.2015	
3317/0	Sluxx HP	Nacktschnecken []	Eisen-III-Phosphat 29.7 g/kg	Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome., Wiederholung bei erneutem Auftreten von Schnecken und/oder wenn keine Granulate mehr auf der behandelten Fläche vorhanden sind	---	7 kg/ha	4	31.12.2015	

Reg Nr.	Handels-bezeichnung	Schadfaktoren	Wirkstoffe	lt. Register					
				Anwendungs-zeitpunkt	Warte-frist Tage	Hektar-aufwand	max. Anzahl	Ende der Zulassung	Aufbrauchs-frist

Die gegenständlichen Erläuterungen stellen einen Auszug aus dem Verzeichnis der in Österreich zugelassenen/genehmigten Pflanzenschutzmittel der AGES dar.

Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher Angaben sind Fehler nicht ausgeschlossen. Die Richtigkeit des Inhaltes ist daher ohne Gewähr.

Im Falle von Unklarheiten nehmen Sie bitte mit Ihrem zuständigen Berater der Landwirtschaftskammer Kontakt auf.

Nutzung nur für Landwirte. Gewerbliche Nutzung ist untersagt.