Bundesamt für Ernährungssicherheit

Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien, Österreich

Information über die Erteilung einer Notfallzulassung gemäß Artikel 53 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009

Pflanzenschutzmittel: „Karate Zeon"
Pfl.Reg.Nr.: 3061
Zulassungsinhaber: Syngenta Agro GmbH

Erweiterung der bestehenden Zulassung mit der 107. - 113. Indikation:

Beginn / Ende der Notfallzulassung:

107., 110., 112. Indikation: **vom 06.05.2019 bis zum Ablauf des 31.08.2019**
108., 109., 113. Indikation: **vom 01.06.2019 bis zum Ablauf des 29.09.2019**
111. Indikation: **vom 15.08.2019 bis zum Ablauf des 29.09.2019**
zugelassen.

Ein Aufbrauch (Lagerung, Inverkehrbringen und Verbrauch) der bestehenden Lagerbestände nach dem Ablauf des

31.08.2019 für die in der Anlage angeführte 107., 110., 112. Indikation
29.09.2019 für die in der Anlage angeführten 108., 109., 111., 113. Indikation
ist nicht zulässig.

Anwendungsbestimmungen

107. Indikation:

Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Kultur/Objekt
Kirschessigfliege (*Drosophilia suzukii*) ***Einschränkung auf adulte Fliegen***	**Johannisbeeren**

Einsatzgebiet:	**Obstbau**
Anwendungsbereich**:**	**Freiland**
Aufwandmenge:	**max. 0,038 l/ha**
Wasseraufwandmenge:	**1000 l/ha (Berechnungsbasis)**
Anwendungszeitpunkt:	**Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; ab Stadium 81 (Beginn der Fruchtreife: sortenspezifische Veränderung der Grundfarbe)**
Max. Anzahl der Anwendungen:	**2**
Zeitlicher Abstand in Tagen:	**7**
Wartefrist in Tagen:	**7**
Nachbaufrist in Tagen:	**---**
Anwendungsart:	**Spritzen oder sprühen**

108. Indikation:

Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Kultur/Objekt
Kirschessigfliege (*Drosophilia suzukii*) ***Einschränkung auf adulte Fliegen***	**Himbeeren, Brombeeren**

Einsatzgebiet:	**Obstbau**
Anwendungsbereich**:**	**Freiland**
Aufwandmenge:	**max. 0,038 l/ha**
Wasseraufwandmenge:	**1000 l/ha (Berechnungsbasis)**
Anwendungszeitpunkt:	**Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; ab Stadium 81 (Beginn der Fruchtreife: sortenspezifische Veränderung der Grundfarbe)**
Max. Anzahl der Anwendungen:	**2**
Zeitlicher Abstand in Tagen:	**7**
Wartefrist in Tagen:	**7**
Nachbaufrist in Tagen:	**---**
Anwendungsart:	**Spritzen oder sprühen**

109. Indikation:

Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Kultur/Objekt
Kirschessigfliege (*Drosophilia suzukii*) ***Einschränkung auf adulte Fliegen***	**Heidelbeeren, Holunder, Apfelbeere (*Aronia sp.)***

Einsatzgebiet:	**Obstbau**
Anwendungsbereich**:**	**Freiland**
Aufwandmenge:	**max. 0,038 l/ha**
Wasseraufwandmenge:	**1000 l/ha (Berechnungsbasis)**
Anwendungszeitpunkt:	**Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; ab Stadium 81 (Beginn der Fruchtreife: sortenspezifische Veränderung der Grundfarbe)**
Max. Anzahl der Anwendungen:	**2**
Zeitlicher Abstand in Tagen:	**7**
Wartefrist in Tagen:	**14**
Nachbaufrist in Tagen:	**---**
Anwendungsart:	**Spritzen oder sprühen**

110. Indikation:

Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Kultur/Objekt
Kirschessigfliege (*Drosophilia suzukii*) ***Einschränkung auf adulte Fliegen***	**Stachelbeeren**

Einsatzgebiet:	**Obstbau**
Anwendungsbereich**:**	**Freiland**
Aufwandmenge:	**max. 0,038 l/ha**
Wasseraufwandmenge:	**1000 l/ha (Berechnungsbasis)**
Anwendungszeitpunkt:	**Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome; ab Stadium 81 (Beginn der Fruchtreife: sortenspezifische Veränderung der Grundfarbe)**
Max. Anzahl der Anwendungen:	**2**
Zeitlicher Abstand in Tagen:	**7**
Wartefrist in Tagen:	**14**
Nachbaufrist in Tagen:	**---**
Anwendungsart:	**Spritzen oder sprühen**

111. Indikation:

Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Kultur/Objekt
Kirschessigfliege (*Drosophilia suzukii*) ***Einschränkung auf adulte Fliegen***	**Weinreben** ***Nutzung als Tafel- und Keltertraube***

Einsatzgebiet:	**Weinbau**
Anwendungsbereich**:**	**Freiland**
Aufwandmenge:	**max. 0,075 l/ha**
Wasseraufwandmenge:	**200 - 400 l/ha**
Anwendungszeitpunkt:	**Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome, ab Stadium 85 (Weichwerden der Beeren)**
Max. Anzahl der Anwendungen:	**1**
Zeitlicher Abstand in Tagen:	**---**
Wartefrist in Tagen:	**7**
Nachbaufrist in Tagen:	**---**
Anwendungsart:	**Spritzen oder sprühen, Anwendung in die Traubenzone**

112. Indikation:

Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Kultur/Objekt
Kirschessigfliege (*Drosophilia suzukii*) ***Einschränkung auf adulte Fliegen***	**Süßkirsche, Weichsel (Sauerkirsche), Marillen**

Einsatzgebiet:	**Obstbau**
Anwendungsbereich**:**	**Freiland**
Aufwandmenge:	**max. 0,075 l/ha** **0,0375 l/ha/m Kronenhöhe**
Wasseraufwandmenge:	**500 l/ha/m Kronenhöhe**
Anwendungszeitpunkt:	**Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome**
Max. Anzahl der Anwendungen:	**2**
Zeitlicher Abstand in Tagen:	**7**
Wartefrist in Tagen:	**7**
Nachbaufrist in Tagen:	**---**
Anwendungsart:	**Spritzen oder sprühen**

113. Indikation:

Schadorganismus/ Zweckbestimmung	Kultur/Objekt
Kirschessigfliege (*Drosophilia suzukii*) ***Einschränkung auf adulte Fliegen***	**Pflaumen (Zwetschken), Pfirsiche**

Einsatzgebiet:	**Obstbau**
Anwendungsbereich**:**	**Freiland**
Aufwandmenge:	**max. 0,075 l/ha** **0,0375 l/ha/m Kronenhöhe**
Wasseraufwandmenge:	**500 l/ha/m Kronenhöhe**
Anwendungszeitpunkt:	**Bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome**
Max. Anzahl der Anwendungen:	**2**
Zeitlicher Abstand in Tagen:	**7**
Wartefrist in Tagen:	**7**
Nachbaufrist in Tagen:	**---**
Anwendungsart:	**Spritzen oder sprühen**

Kennzeichnungsvorschriften

Gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 wird die Zulassung mit den folgenden Auflagen und Bedingungen hinsichtlich der Kennzeichnung für die 107. bis 113. Indikation erteilt:

- **Für die 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113. Indikation:**
  Zum Schutz von Gewässerorganismen nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern anwenden. In jedem Fall ist eine unbehandelte Pufferzone mit folgendem Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten, wobei eine Anwendung nur mit Pflanzenschutzgeräten bzw. -geräteteilen, die im Erlass des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung, gelistet sind, zulässig ist:

Beerenobst ausgenommen Holunder, Schadorganismus Kirschessigfliege	**Spritzen oder sprühen**	**20 m**	**(Abtriftminderungsklasse 50%)**
		15 m	**(Abtriftminderungsklasse 75%)**
		10 m	**(Abtriftminderungsklasse 90%)**
Holunder, Schadorganismus Kirschessigfliege	**Spritzen oder sprühen**	**20 m**	**(Abtriftminderungsklasse 75%)**
		15 m	**(Abtriftminderungsklasse 90%)**
Weinbau, Schadorganismus Kirschessigfliege	**Spritzen oder sprühen**	**20 m**	**(Abtriftminderungsklasse 75%)**
		10 m	**(Abtriftminderungsklasse 90%)**
		10 m	**(Abtriftminderungsklasse 95%)**
Steinobst (vor und während der Blüte), Schadorganismus Kirschessigfliege	**Spritzen oder sprühen**	**20 m**	**(Abtriftminderungsklasse 95%)**
Steinobst (nach der Blüte), Schadorganismus Kirschessigfliege	**Spritzen oder sprühen**	**20 m**	**(Abtriftminderungsklasse 90%)**
		15 m	**(Abtriftminderungsklasse 95%)**

- **Für die 107., 108., 109., 110. Indikation:**
  Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik

(Abdriftminderungsklasse mind. 90% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, G Z. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.

- **Für die 111., 112., 113. Indikation:**
  Zum Schutz von Nicht-Ziel-Arthropoden ist eine Abdrift in angrenzendes Nichtkulturland zu vermeiden und das Pflanzenschutzmittel in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzendem Nichtkulturland (ausgenommen Feldraine, Hecken und Gehölzinseln unter 3 m Breite sowie Straßen, Wege und Plätze) mit abdriftmindernder Technik (Abdriftminderungsklasse mind. 95% gemäß Erlass des BMLFUW vom 10.07.2001, GZ. 69.102/13-VI/B9a/01 in der jeweils geltenden Fassung) auszubringen.
- **Für die 107., 108., 109., 110., 112., 113. Indikation:**
  Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Jahr auf derselben Fläche, auch keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, diese(n) Wirkstoff(e) enthaltenden Mitteln.
- **Für die 111. Indikation:**
  Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Jahr auf derselben Fläche, auch keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, diese(n) Wirkstoff(e) enthaltenden Mitteln.
- **Für die 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113. Indikation:**
  Bei wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe oder solcher mit Kreuzresistenz können Wirkungsminderungen eintreten oder eingetreten sein. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel einen Beratungsdienst hinzuziehen.
- **Für die 107., 108., 109., 110., 111., 112., 113. Indikation:**
  Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.